

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że w dniu 09.01.2025r. na terenie powiatu torunskiego został stwierdzony pierwszy przypadek rzekomego pomoru drobiu – choroba Newcastle. Zakażenie wystąpiło na terenie gminy Chelmża, w miejscowości Głuchowo w gospodarstwie drobiu – (chów przyzagrodowy).

Objawy rzekomego pomoru drobiu (ND):

Rzekomy pomór drobiu (ND – Newcastle Disease) może przebiegać z bardzo dużą śmiertelnością, w przeciągu 3-4 dni od wystąpienia objawów klinicznych. Jest to jedna z najbardziej powszechnych i wysoce zaraźliwych chorób układu oddechowego, na którą narażone są ptaki w każdym wieku – zarówno hodowlane jak i dzikie. Śmiertelność u zakażonych zwierząt może dochodzić nawet do 100%.

Typowe objawy kliniczne rzekomego pomoru drobiu:

- Utrudnione oddychanie;
- Zasinienie grzebieni;
- Rzężenia i charczenia, którym towarzyszą objawy nerwowe, takie jak porażenia, czy skręty szyi;
- Produkcja nieśna spada od 30 do 50% lub więcej i powraca do normy po około 2 tygodniach. Jaja mogą mieć cienką skorupę, typowe jest również składanie jaj bez skorup (tzw. „łanie jaj” – jaj w błonach).

Rzekomy Pomór Drobiu – Choroba Newcastle przenoszona jest drogą kropelkową. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z wydzieliną zapalną, np. podczas korzystania z jednego poidła lub karmnika, do którego dostęp miało zakażone zwierzę. Odchody chorych ptaków zawierające wirus zanieczyszczają paszę, wodę i otoczenie, stanowiąc źródło zakażenia. Środki dezynfekujące łatwo niszczą wirus, ale w ściółce może on zachować żywotność nawet przez 2 miesiące, a w padłych ptakach – nawet przez 12 miesięcy. Okres inkubacji choroby trwa od 2 do 15 dni.

Posiadacz drobiu, jak również lekarz weterynarii opiekujący się stadem, powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- Zwiększona śmiertelność;
- Znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- Objawy nerwowe, takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
- Dusznosc;
- Sinica i wybroczyny;
- Nagły spadek nieśności.

Zwalczanie rzekomego pomoru drobiu

- Rzekomy pomór drobiu nie podlega leczeniu. Jest to choroba zwalczana z urzędu. Następuje likwidacja stada oraz jego utylizacja. Należy wówczas usunąć wszystkie przedmioty, z którymi ptaki miały kontakt oraz wykonać dokładną dezynfekcję pomieszczeń oraz urządzeń.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRYZAGRODOWY

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwie, należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń:

- Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- Przechowywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- Odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- Przechowywanie paszy, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- Zakaz pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (ze zbiorników wodnych i rzek);
- Zgłaszanie lekarzowi weterynarii lub innym organom władzy lokalnej, zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- Używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- Osoby utrzymujące drób w chowie przyzagrodowym, nie powinny być zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Spełnienie wyżej wymienionych zasad bioasekuracji przez hodowców drobiu przyzagrodowego, w przypadku wystąpienia choroby – rzekomego pomoru drobiu jest warunkiem wypłacenia odszkodowania ze Skarbu Państwa w związku z likwidacją ogniska.

Wirus rzekomego pomoru drobiu- choroby Newcastle nie jest chorobotwórczy dla ludzi, aczkolwiek kontakt z wirusem zjadliwym terenowym może wywoływać podrażnienie górnych dróg oddechowych oraz być przyczyną łagodnego zapalenia spojówek.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Toruniu

Violetta Hermann-Krupińska

Toruń, dnia 10 stycznia 2025r.